Co mi zabilo slepice v kurníku? Jak poznat kunu, lišku, tchoře nebo potkana

Ráno otevřete kurník a během několika vteřin je jasné, že se v noci něco stalo. Některé slepice chybějí, jiné leží uvnitř, kolem je peří nebo poškozené pletivo. V takové chvíli je přirozené hledat rychlou odpověď. Jenže **jeden znak obvykle nestačí k bezpečnému určení viníka**.

Kuna, tchoř, liška, pes, potkan i dravec po sobě mohou zanechat podobné stopy. Nejlepší vodítko získáte teprve spojením několika informací: **kdy k útoku došlo, kolik kusů chybí, kde jsou poranění, co bylo pozřeno a kudy se zvíře dostalo dovnitř**.

> **Nejdříve bezpečí, teprve potom pátrání.**
>
> Přeživší drůbež přemístěte do bezpečného uzavřeného prostoru, zraněné kusy oddělte a podle stavu kontaktujte veterináře. Použijte rukavice, zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat a před úklidem vše vyfotografujte. Pokud na tělech nejsou zjevná poranění a více kusů uhynulo náhle, nepředpokládejte automaticky útok predátora – může jít také o nákazu nebo jiný zdravotní problém.

Rychlá orientace:

Více usmrcených slepic s poraněním krku může ukazovat na kunu, tchoře nebo jinou lasicovitou šelmu. **Celá chybějící slepice a peří podél únikové cesty** častěji ukazují na lišku. **Potrhané, ale málo pozřené kusy** může mít na svědomí pes. **Chybějící kuřata, poškozená vejce, trus a okousané dřevo** mohou znamenat potkany. Jde však pouze o vodítka – potvrzení hledejte ve stopách a místě vniknutí.

V tomto návodu zjistíte:

- Co udělat bezprostředně po útoku
- Kdy nemusí jít o predátora
- Jaké stopy zanechávají jednotliví predátoři
- Jak poznat kunu, tchoře nebo lasičku
- Jak odlišit lišku od psa
- Kdy mohou být viníkem potkani
- Jaké stopy zanechá dravec nebo sova
- Jak najít místo vniknutí
- Jak zabránit dalšímu útoku

- Kdy může dávat smysl živolovná past

Co udělat bezprostředně po útoku v kurníku

Neuklízejte všechno okamžitě. Právě rozložení peří, poloha uhynulých kusů, stopy u dveří a poškozené místo mohou nejlépe ukázat, co se stalo. Zároveň ale nenechávejte přeživší slepice v nezabezpečeném kurníku další noc.

1. **Zabezpečte přeživší drůbež.** Přesuňte ji do uzavíratelného prostoru bez mezer a poškozeného pletiva. Pokud přesun není možný, provizorně zakryjte zjištěný vstup pevnou deskou nebo svařovaným kovovým pletivem.
2. **Oddělte poraněné kusy.** Krvácení a otevřené rány mohou přitahovat klování ostatních slepic. U hlubokých ran, potíží s dýcháním, silného krvácení nebo apatie kontaktujte veterináře.
3. **Použijte rukavice.** Nedotýkejte se uhynulých ani poraněných ptáků holýma rukama. Po skončení očistěte obuv a použité pomůcky.
4. **Vyfotografujte místo před úklidem.** Zachyťte celý kurník, polohu ptáků, peří, trus, otisky, poškozené pletivo i okolí možného vstupu.
5. **Spočítejte slepice, kuřata a vejce.** Rozdíl mezi chybějícím a usmrceným kusem je pro určení predátora důležitý.
6. **Zapište si čas.** Kdy byly slepice naposledy v pořádku? Byl kurník na noc uzavřený? Odehrál se útok ve dne, po setmění nebo nad ránem?
7. **Prohlédněte kurník zevnitř i zvenku.** Predátor mohl přijít pod plotem, přes střechu, větracím otvorem nebo kolem dveří. Kontrola pouze u země nestačí.

> **Nenastavujte náhodně past hned první noc.** Nejdříve určete pravděpodobný druh a trasu. Jinak můžete odchytit kočku, ježka nebo jiné necílové zvíře, zatímco skutečný predátor se vrátí jinou cestou.

Ne každá mrtvá slepice znamená útok predátora

Pokud chybí peří, je poškozené pletivo nebo jsou vidět rány po kousnutí, útok zvířete je pravděpodobný. Jestliže ale několik slepic uhynulo během krátké doby **bez zjevného poranění a bez známek vniknutí**, je nutné uvažovat také o onemocnění, otravě, přehřátí nebo jiném zdravotním problému.

Státní veterinární správa uvádí mezi varovnými příznaky ptačí chřipky například náhlé úhyny, apatii, načepýřené peří, dýchací potíže, pokles příjmu krmiva a výrazné snížení snášky. **Pokud podobné**

příznaky pozorujete také u přeživších ptáků, nemanipulujte zbytečně s chovem a co nejdříve kontaktujte veterináře nebo příslušnou krajskou veterinární správu.

Při podezření na nákazu nepřesouvejte ptáky, podestýlku ani pomůcky do jiného chovu. Aktuální informace najdete na stránce Státní veterinární správy.

Přehled stop: co mohlo napadnout slepice

Tabulku používejte jako orientační rozcestník, ne jako definitivní určení. Hladové zvíře, vyrušený predátor nebo dvě různá zvířata na jednom místě mohou vytvořit netypický obraz.

Možný původce	Typická vodítka	Kde hledat potvrzení
Kuna nebo tchoř	Útok často v noci, více usmrcených kusů, poranění především u hlavy a krku, část kořisti může zůstat nesnědená.	Malý otvor, mezera u střechy či dveř cesta podél stěny, pět prstů ve stopě nebo záznam z kamery.
Liška	Celá slepice může zmizet; zůstane peří v místě uchopení nebo podél únikové cesty.	Podhrabaný plot, stopa podobná me psovi, protlačené dveře, vyšlapaná s
Pes	Slepice bývají rozházené nebo silně potrhané, ale málo pozřené. Útok může proběhnout i ve dne.	Větší poškození plotu, široké stopy, na pletivu nebo svědectví sousedů či kamery.
Potkan	Častěji mizí vejce, kuřata nebo mladí ptáci; mohou být částečně okousaní. Dospělé zdravé slepice nebývají první volbou.	Trus, nory, mastné otěry podél stěn, okousané dřevo a zásobníky, rozsyp krmivo.
Dravec	Útok zpravidla ve dne a častěji ve výběhu. Může zůstat větší množství vytrhaného peří a jedna napadená slepice.	Nezakrytý výběh, otevřený přístup s žádný podhrabaný plot ani poškozen dvířka.
Sova	Podobné znaky jako u denního dravce, ale útok proběhne v noci; postižena může být hlavně hlava a krk.	Otevřená horní část výběhu, nezakry okno nebo drůbež ponechaná přes n venku.

Kuna, tchoř nebo lasička: podobné stopy, rozdílné zvíře

Více usmrcených slepic během jedné noci bývá často připisováno „lasičce". V běžné řeči se však tímto slovem někdy označují různé lasicovité šelmy. U dospělých slepic může být reálnějším podezřelým

kuna nebo tchoř, zatímco drobná lasice častěji loví malé hlodavce a může představovat větší riziko pro kuřata než pro velké dospělé kusy.

Kuna dobře šplhá, proto nemusí vniknout pouze u země. Dokáže využít nezajištěný větrací otvor, mezeru u střechy, podbití nebo horní část dveří. Tchoř se častěji pohybuje při zemi a jeho přítomnost může doprovázet výrazný pižmový pach. Samotný pach, ukousnutá hlava ani několik mrtvých slepic ale druh spolehlivě nepotvrdí.

Podezření posílí kombinace těchto znaků:

- útok proběhl mezi večerem a časným ránem,
- v kurníku zůstalo více usmrcených kusů,
- viditelná poranění jsou zejména na hlavě nebo krku,
- kořist nebyla celá odnesena ani spotřebována,
- vstup je menší, než byste čekali, nebo se nachází nad zemí,
- fotopast zachytí zvíře na stejné trase více nocí po sobě.

Další krok není pouze odstranění zvířete. Nejdůležitější je **zabezpečit kurník proti kuně, tchoři a lasicovitým šelmám**, jinak se může vrátit stejný nebo jiný predátor.

Liška, nebo pes? Rozhoduje vstup, stopy a způsob odnesení kořisti

Liška často odnese celou slepici a může se pro další vracet. V místě útoku nebo podél únikové trasy pak zůstanou chomáče peří. Do nezajištěného výběhu se může podhrabat, protlačit slabé místo nebo využít nedovřená dvířka.

Pes naopak často drůbež pronásleduje a napadá, aniž by ji skutečně potřeboval jako potravu. Výsledkem mohou být potrhané nebo rozházené kusy a větší poškození plotu. Neplatí to ale pokaždé – malý pes může zanechat stopu podobnou lišce a liška může při vyrušení kořist nechat ležet.

Nespoléhejte jen na velikost otisku. Vyfotografujte stopu s pravítkem, sledujte směr příchodu a zkontrolujte, zda jsou na pletivu chlupy. Největší jistotu poskytne kamera namířená na pravděpodobnou trasu, nikoli na vnitřek hnízda.

Kdy mohou slepice nebo kuřata napadnout potkani

Potkani přicházejí především za snadno dostupným krmivem, vodou a úkrytem. Nejvíce ohrožují **vejce, čerstvě vylíhlá kuřata a mladé nebo oslabené ptáky**. Pokud mizí vejce, objevují se okousané části dřeva, nory pod kurníkem, tmavý trus a mastné otěry podél stěn, je přítomnost hlodavců pravděpodobná.

Rozsypané krmivo ukliďte každý večer a zásoby přesuňte do uzavíratelné nádoby, kterou hlodavec neprokouše. Opravte otvory odolným materiálem a zkontrolujte prostor pod podlahou. Jed ani nezajištěnou past nepokládejte tam, kde se k nim mohou dostat slepice, děti, kočky nebo volně žijící živočichové.

Podrobný postup najdete v návodech **Jak se zbavit potkanů u domu** a **Jak nastražit past na potkany**.

Dravec nebo sova: zkontrolujte přístup shora a čas útoku

Pokud byla napadena jedna slepice ve výběhu, kolem zůstalo velké množství peří a plot ani dveře nejsou poškozené, může jít o útok ze vzduchu. Denní útok více odpovídá dravci, noční útok sově. Přesné určení podle zbytků ale není spolehlivé.

Dravce ani sovy nechytejte do pasti a nepoužívejte jed. Řešením je fyzická ochrana: zakrytí výběhu vhodnou sítí nebo pletivem, omezení velkých otevřených ploch a bezpečný uzavřený kurník na noc. Pokud si nejste jistí druhem nebo zákonným postupem, obraťte se na odborníka na ochranu přírody.

Jak najít místo, kudy se predátor dostal dovnitř

Místo útoku a místo vstupu nemusí být stejné. Prohlídku začněte uvnitř a postupujte po celém obvodu ven. Kontrolujte také střechu, horní rohy a větrání.

1. **Dveře a zavírání:** hledáte uvolněnou petlici, mezeru pod dveřmi nebo jednoduchou západku, kterou lze nadzvednout.
2. **Pletivo a spoje:** zkontrolujte roztržení, ohnutí, rez, nedotažené spony a místo napojení pletiva na rám.
3. **Podlaha a obvod:** hledejte čerstvou hlínu, noru, průchod pod prahem nebo mezeru mezi stavbou a terénem.
4. **Střecha a větrání:** kuna může využít otvor vysoko nad zemí; běžná síť proti hmyzu není ochrana proti predátorovi.
5. **Peří a chlupy:** zachycené peří může ukázat směr odnesení kořisti, chlupy na ostrém okraji místo průchodu.
6. **Stopy:** pokud je zem suchá, nasypte na předpokládanou trasu tenkou vrstvu jemného písku a umístěte fotopast tak, aby snímala přístup ke kurníku.

Otvor ihned uzavřete pouze tehdy, když nehrozí, že uvnitř zůstalo živé divoké zvíře. Je-li predátor stále v kurníku nebo přilehlé dutině, zachovejte odstup, odveďte lidi a domácí zvířata a přivolejte zkušenou pomoc.

Jak zabránit dalšímu útoku

Predátor se může vrátit už následující noc. Pokud jednou našel snadno dostupnou potravu, je samotné odnesení uhynulých kusů nebo použití odpuzovače málo. Nejdříve udělejte bezpečné provizorní zabezpečení a následně opravte celý kurník.

Ještě dnes	Trvalá úprava
Přesuňte slepice do neporušeného uzavíratelného prostoru.	Nahraďte slabé nebo potrhané části pevným svařovaným kovovým pletivem.
Zakryjte nalezený otvor deskou nebo pevnou kovovou sítí.	Zabezpečte okna a větrání jemnou svařovanou sítí; běžná okenní síť nestačí.
Odstraňte zbytky krmiva a uzavřete zásoby.	Zpevněte obvod proti podhrabání a pletivo zapusťte nebo vyveďte jako vodorovnou zástěru ven.
Zajistěte dvířka pevnou západkou, kterou zvíře nenadzvedne.	Zakryjte výběh shora a opravte všechny spoje, nikoli jen místo posledního útoku.

Pro okna a větrací otvory se běžně používá svařovaná kovová síť s oky přibližně **12–13 mm**. Oplocení proti podhrabání lze zapustit zhruba **30 cm do země** a jeho spodní část vyvést přibližně **20–25 cm směrem ven**. Konkrétní řešení přizpůsobte podloží, konstrukci a druhu rizika.

Jeden nalezený otvor nemusí být jediný

Predátor příště vyzkouší jiné slabé místo. Zkontrolujte proto celý kurník od základů až po střechu.

Přečíst návod: Jak zabezpečit kurník proti kuně a lasičkám

Kdy může dávat smysl živolovná past

Past není nástroj k určení viníka. O jejím použití uvažujte až tehdy, když máte pomocí stop nebo kamery potvrzený druh, znáte pravidelnou trasu a ověřili jste zákonný postup. Náhodně položený sklopec vedle kurníku může odchytit necílové zvíře a nevyřeší nezabezpečený vstup.

Kuna lesní, kuna skalní, liška obecná a tchoř tmavý jsou podle zákona o myslivosti vedeny jako zvěř. To neznamená, že je může kdokoli kdykoli svévolně lovit, převážet nebo vypouštět. Před použitím pasti kontaktujte místního mysliveckého hospodáře, uživatele honitby nebo příslušný orgán státní správy myslivosti. Odchyt musí respektovat také ochranu zvířat proti týrání.

Pokud je živolovný odchyt pro daný případ vhodný, pomohou vám návody **Jak vybrat živolovnou past** a **Jak nastražit past na kunu**.

Nejdřív zjistit. Potom jednat.

Živolovný sklopec NOVAline o rozměrech **80 × 26 × 26 cm** je určen pro kontrolovaný odchyt kuny, tchoře, potkana a dalších zvířat odpovídající velikosti. Má jeden vstup, nášlapný mechanismus a pozinkovanou konstrukci. Použijte jej pouze po určení cílového druhu, ověření pravidel a na místě, kde můžete past pravidelně kontrolovat.

Prohlédnout živolovnou past

Zobrazit celou kategorii Ochrana před škůdci

Co po útoku raději nedělat

- **Neurčujte predátora podle jediného znaku.** Chybějící hlava nebo více mrtvých slepic nejsou samy o sobě spolehlivým důkazem.
- **Nenechávejte přeživší drůbež další noc ve stejném nezajištěném prostoru.**
- **Nepokládejte volně jed nebo nezajištěnou past.** Ohrozili byste slepice, domácí zvířata i necílové volně žijící živočichy.
- **Neucpávejte bez rozmyslu dutinu se zvířetem uvnitř.** Predátor se může pokusit prorazit jinudy nebo může dojít k jeho utrpení.
- **Nevypouštějte odchycené zvíře automaticky na libovolném místě.** Nejdříve ověřte druh a zákonný postup.
- **Neignorujte zdravotní příznaky u zbývajících slepic.** Náhlý úhyn bez poranění patří veterináři, nikoli do automatické diagnózy „kuna".

Kontrolní seznam: co napadlo moje slepice?

Připravujeme přehledný kontrolní list se stopami jednotlivých predátorů, místy, která zkontrolovat, a kroky pro zabezpečení kurníku.

Často kladené otázky

Které zvíře zabije více slepic a nechá je ležet?

Takový obraz může vzniknout po útoku kuny, tchoře nebo jiné lasicovité šelmy, ale také po útoku psa. Rozhoduje zejména místo poranění, velikost vstupu, čas útoku, stopy a záznam z kamery. Samotný počet mrtvých slepic nestačí.

Co slepici ukousne hlavu?

Poranění hlavy nebo krku může zanechat lasicovitá šelma, sova i predátor, který na slepici dosáhl přes pletivo. Proto zkontrolujte nejen tělo, ale také oka pletiva, místo, kde slepice nocují, a přístup shora.

Vrátí se predátor do kurníku znovu?

Je to pravděpodobné, pokud zůstane zachována stejná přístupová cesta a snadno dostupná potrava. Proto přesuňte přeživší drůbež do bezpečí a opravte slabá místa dříve, než slepice vrátíte.

Stačí proti kuně běžné králičí nebo kuřecí pletivo?

Lehké pletivo je často navrženo hlavně k udržení drůbeže uvnitř, nikoli k zastavení silného predátora. Pro kritická místa použijte pevné svařované kovové pletivo, dobře je připevněte k rámu a zkontrolujte všechny spoje.

Jak poznám, že šlo o potkana?

Hledejte nory, trus, okousané dřevo nebo plasty, mastné stopy podél stěn a rozsypané krmivo. Potkani častěji napadají vejce, kuřata a mladé nebo oslabené kusy než zdravé dospělé slepice.

Kdy mám kontaktovat veterináře?

Při hlubokých ranách, silném krvácení, potížích s dýcháním, neschopnosti stát nebo výrazné apatii. Veterináře či krajskou veterinární správu kontaktujte také při náhlém úhynu více kusů bez viditelného napadení nebo pokud mají přeživší ptáci příznaky onemocnění.

Mohu hned nastražit past na kunu?

Nejdříve potvrďte, že šlo skutečně o kunu, zjistěte její trasu a ověřte zákonný postup. Past musí být bezpečně umístěná, chráněná před počasím a pravidelně kontrolovaná. Současně vždy zabezpečte samotný kurník.

Nejdůležitější není jméno predátora. Nejdůležitější je další bezpečná noc.

Stopy vám pomohou zúžit okruh podezřelých, ale kurník zabezpečte jako celek. **Ochraňte přeživší slepice, zdokumentujte místo, najděte vstup a opravte všechny slabiny.** Teprve potom řešte odchyt nebo další cílené opatření podle potvrzeného druhu.

Pokračujte návodem **Jak zabezpečit kurník proti kuně a lasičkám** nebo si prohlédněte **ochranu před škůdci na NOVAline**.

Odborné zdroje

- University of Maryland Extension – Identifying and Preventing Poultry Predators
- University of Maryland Extension – Rodent Control on Small Poultry Farms
- Státní veterinární správa – Ptačí chřipka: informace pro veřejnost
- Ministerstvo zemědělství – zákon č. 449/2001 Sb., vymezení druhů zvěře
- e-Sbírka – zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Obsah byl odborně ověřen a aktualizován 23. 9. 2026. Článek má informační charakter a nenahrazuje veterinární vyšetření, určení druhu odborníkem ani právní poradenství.